



Cantidad por

tableta

2.1Kcal / 8,8 Kj

0.5 gr

0.41 gr

0.09 gr

0.009 gr

0.05 mg

6.5 mcg

1.0 mcg

0.09 ug

162.5 mg

42.5 mg

10.0 mg

120.8 mg

29.2 mg

29.2 mg

29.25 mg 26.6 mg

25.0 mg

25.0 mg

Información nutricional

alor energético

Aminoácidos

Equivalente en proteínas

Hidratos de carbono

Grasas Totales

Vitaminas

Vitamina B6

Ácido Fólico

Biotina

Vitamina B12

Aminoá<u>cido</u>

L-Tirosina

L-Triptofano

L-Metionina

L-Lisina

L-Isoleucina

L-Valina

L-Treonina

L-Arginina

Cantidad por 100

gramos

307 Kcal =1290 Kj

73 gr

60 gr 13.1 gr

1.31 gr

7.3 mg

0.96 mg

0.15 mg

13.2 ug

24 gr

6,3 gr

1,5 gr

18 gr

4,3 gr

4,3 gr

4,3 gr

4 gr

3,8 gr

3,8 g

Aminoácidos neutros de cadena larga (LNAA) en tabletas para el manejo dietario de pacientes con Fenilcetonuria.

Características

- Contiene vitaminas.
- Presentación: Frasco de 550 tabletas de 685 ma cada una. Las mismas contienen 500 mg de aminoácidos.
- Mecanismo de acción: los LNAA actúan compitiendo con el transportador de fenilalanina en el tracto gastrointestinal, inhibiendo de esta manera, la absorción de fenilalanina a este nivel. Como resultado se reduce la entrada de fenilalanina en el cerebro y disminuyen los valores de este aminoácido en sangre.
- Recomendable desde los 8 años en adelante, para adolescentes con baja adherencia al tratamiento, PKU con diagnóstico tardío, sin dieta y adultos.
- Dosis recomendada: 1 tableta por kg de peso.

- Puede ingerirse con agua o jugos permitidos.

•	Se aconseja su ingesta distribuida tres a	· ·	
	,	L-Histidina	
	cuatro veces en el día con las comidas.		
•	Debe ser suplementada con una dieta		
	moderadamente restrictiva en fenilalanina.		
•	Puede ingerirse con gaug e juges		

Beneficios

- Flexibiliza parcialmente la dieta
- Insípido
- Ideal para adolescentes y adultos con baja adherencia al tratamiento

Contraindicaciones

No debe ser utilizado durante el embarazo